

اظهرت نتائج الجدول تاثيرالمبيدات المستخدمة لنيماتودا تعقد الجذور وبعد ٢ اسبوع من المعاملة بلغت نسبة شدة الاصابة ٦.٧% بالمبيد فيديت واختلفت معنوياً عن المبيد سمارت و كارفكروك % اذ بلغا ٥.٣% و ٣.٦% على التوالي ، وبعد ٤ اسبوع من المعاملة بلغت نسبة شدة الاصابة ٨.٤% واختلفت معنوياً عن بقية المعاملات اذ بلغت ٦.٤% عند سمارت و ٥.٦% عند المبيد كارفكروك، اما بعد ٨ اسبوع من المعاملة فبلغت اعلى نسبة شدة الاصابة ووصلت الى ١٢.٢% فايديت واختلفت معنوياً عن بقية المعاملات اذ بلغت ٨.٩% عند التركيز سمارت و ٦.٢% عند مبيد كارفكروك.

تأثير استخدام المبيدات على نسبة شدة الاصابة للنيماتودا تعقد الجذور

المعدل	نسبة شدة الاصابة % بعد(اسبوع)			المبيد
	٨	٤	٢	
٥.١٣	٦.٢	٥.٦	٣.٦	كارفكروك
٦.٨٦	٨.٩	٦.٤	٥.٣	سمارت
٩.١	١٢.٢	٨.٤	٦.٧	فيديت
	٩.١	٦.٨	٥.٢	المعدل
LSD 0.01 للمبيد=٠.٣١، للوقت = ٠.٣٢ ، للتداخل = ٠.٥٤				

كل رقم داخل الجدول يمثل معدل ثلاث مكررات